

BOLIVIA

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2018

Incidencia
(100.000 hab.) **54,7**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis Trienio
(ICLTc 2016-2018) **Alto**

Ocurrencia


3127

NUEVOS CASOS

2673 cutáneas (85,5%)

428 mucosas (13,7%)

26 no especificado (0,8%)



**ICLTc trienio
(2016-2018)**

3,88 - 7,75 (Muy intenso)

2,65 - 3,83 (Intenso)

0,65 - 2,64 (Alto)

-0,43 - 0,64 (Medio)

-0,87 - -0,44 (Bajo)



GRUPO DE EDAD

4,4% < 5 años
7,6% ≥ 5 < 10 años
87,7% > 10 años
0,3% No especificado

12% niños menores
de 10 años



SEXO

70,5% Masculino
29,5% Femenino

64% hombres
mayores de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **5** países
en **31** provincias

36,9% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

50,5% de la población
en zonas de transmisión

Disminución del % de
LC en menores de 10
años en relación con el
año anterior (Meta del
Plan de Acción 2017-
2022).



ESPECIES DE LEISHMANIA

Información **NO**
disponible en el
SisLeish



VECTORES LUTZOMYIA

Información **NO**
disponible en el
SisLeish



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
99,9%

Cura clínica: **66,8%**

% Pacientes curados entre
los tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Información **NO**
disponible en el
SisLeish

Fuente:

SisLeish - OPS/OMS - Datos disponibles por los Ministerios de Salud
Programas Nacionales de Leishmaniasis de los países
Acceso en: 01 Noviembre, 2019.

S/I : Sin información