


# BRASIL

## Leishmaniasis cutánea y mucosa 2018

Incidencia  
(100.000 hab.) **15,8**

Transmisión **Muy Intenso**  
Indice Compuesto de  
Leishmaniasis Trienio  
(ICLTc 2016-2018)



Ocurrencia


**16432**

NUEVOS CASOS

15632 cutáneas (95,1%)

800 mucosas (4,9%)

ICLTc trienio  
(2016-2018)



\*El MSPS reportó 1305 casos desde municipios desconocidos que no fueron incluidos en el cálculo del índice compuesto de leishmaniasis.



### GRUPO DE EDAD

2,8% < 5 años  
3,2% ≥ 5 < 10 años  
93,1% > 10 años  
0,9% No especificado

**6%** niños menores de 10 años



### SEXO

74,2% Masculino  
25,8% Femenino

**70,1%** hombres mayores de 10 años



### FRONTERAS

Frontera con **10** países en **588** municipios

**17%** de los casos en las fronteras



### VIGILANCIA Y CONTROL

**49,8%** de la población en zonas de transmisión

**Disminución** del % de LC en menores de 10 años en relación con el año anterior (Meta del Plan de Acción 2017-2022).



### ESPECIES DE LEISHMANIA

*L. amazonensis*  
*L. braziliensis*  
*L. guyanensis*  
*L. lainsoni*  
*L. lindenbergi*  
*L. naiffi*  
*L. shawi*



### VECTORES LUTZOMYIA

*L. flaviscutellata*, *L. whitmani*,  
*L. neivai*, *L. migonei*, *L. intermedia*, *L. complexa*, *L. wellcomei*, *L. davisii*, *L. fischeri*, *L. pessoai*, *L. umbratillis*, *L. ubiquitousis*, *L. ayrozai*, *L. paraensis*, *L. amazonensis*, *L. salesi*, *L. shawi*



### ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio: **82,3%**

Cura clínica: **72,4%**

% Pacientes curados entre los tratados: **75,4%**



### MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de Meglumina  
Anfotericina B  
Desoxicolato  
Anfotericina B Liposomal  
Isetionato de Pentamidina

Fuente:

SisLeish - OPS/OMS - Datos disponibles por los Ministerios de Salud  
Programas Nacionales de Leishmaniasis de los países  
Acceso en: 01 Noviembre, 2019.

S/I : Sin información