

HONDURAS

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2016

Incidencia
(100.000 hab.) **43,91**

Transmisión
Índice Compuesto de
Leishmaniasis (ICLc) **Intenso**


Ocurrencia

2666

NUEVOS CASOS

2647 cutáneas (99,3%)

19 mucosas (0,7%)



GRUPO DE EDAD

10,1% < 5 años
10,7% ≥ 5 < 10 años
79,2% > 10 años

20,8% niños
menores de 10 años



SEXO

60,3% Masculino
39,7% Femenino

49,8% hombres a
más de 10 años



FRONTERAS

Frontera con **3** países
en **12** municipios

15,1% de los casos
en las fronteras



VIGILANCIA Y CONTROL

69,9% de la población
en zonas de transmisión

Participa del **PEED**
(Programa Regional de
Evaluación Externa
Directa del Desempeño
para el diagnóstico
microscópico)



ESPECIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. panamensis
L. intantum



VECTORES LUTZOMYIA

L. trapidoi
L. panamensis
L. ylephiletor
L. ovallesi
L. longipalpis



ASISTENCIA AL PACIENTE

Diagnóstico de laboratorio:
100% (**24** laboratorios
hacen el diagnóstico)

Cura clínica: **100%** (**6**
unidades de atención
hacen el tratamiento)



MEDICAMENTOS DISPONIBLES

Antimoniato de
Meglumina

Anfotericina B
Desoxicolato