

NICARÁGUA

Leishmaniose cutânea e mucosa 2016

Incidência
(100.000 hab.) **197,2**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose (ICLc) **Muito
Intenso**

Ocorrência


5423

NOVOS CASOS

5384 cutâneas (99,3%)

28 mucosas (0,5%)

11 Não especificado
(0,2%)



GRUPO DE IDADE

15,2% < 5 anos
14,9% ≥ 5 < 10 anos
69,7% > 10 anos
0,2% Não especificado

30,1% crianças
menores de 10 anos



SEXO

58,5% Masculino
41,3% Feminino

42,9% homens
acima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **2** países
em **27** municípios

33% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

43,5% da população em
áreas de transmissão

Participa do **PEED**
(Programa Regional de
Avaliação Externa Direta
de Desempenho para o
diagnóstico microscópico)



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. panamensis
L. infantum



VETORES LUTZOMYIA

L. panamensis
L. trapidoi
L. ylephiletor
L. cruciata
L. longipalpis
L. evansi



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
94,5% (S/I
laboratórios que fazem
diagnóstico)

Cura clínica: **91,2%**
(S/I unidades de atenção
que fazem tratamento)



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina

Anfotericina B
desoxicolato